



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

**Анализ динамики заболеваемости
наркоманией, алкоголизмом и алкогольными психозами
по показателям социально-гигиенического мониторинга
в Калининградской области в 2025 году и за период с 2021 по 2025 годы**

Калининград

2026 год

ПРЕДИСЛОВИЕ

Информационный бюллетень подготовлен
специалистами отдела социально-гигиенического мониторинга
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области
под руководством
Главного государственного санитарного врача по Калининградской области

БАБУРА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

в соответствие с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 05.12.2006 №383 «Об утверждении Порядка информирования органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения о результатах полученных при проведении социально-гигиенического мониторинга», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 № 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга»

При подготовке информационного бюллетеня использованы:

- сводные годовые сведения отчетной формы федерального государственного статистического наблюдения № 11 «Сведения о заболеваниях наркологами расстройствами» - представлены государственным казенным учреждением здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» (директор Никитин Геннадий Сергеевич);
- численность населения Калининградской области на начало 2022-2024гг. - официальные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области: источник информации: <https://39.rosstat.gov.ru/>
- численность населения Калининградской области на 01.01.2025 - данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС)

Данные представлены по сводным годовым сведениям отчетной формы федерального государственного статистического наблюдения № 11 «Сведения о заболеваниях наркологами расстройствами», содержит: Раздел 1. Сведения о числе наркологами расстройств. Таблица 1000: Сведения о числе заболеваний наркологами расстройствами, зарегистрированных впервые в жизни у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации, единица; Таблица 2000: Сведения о числе заболеваний наркологами расстройствами, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации, единица.

Первичная заболеваемость - показатель, который рассчитывается на основании числа зарегистрированных заболеваний наркологами расстройствами у пациентов, обратившихся в специализированные (психиатрические и наркологами) учреждения *впервые в жизни* в течение отчетного года.

Распространённость (синонимы - общая заболеваемость, учтенная болезненность, болезненность) - показатель, который отражает *распространённость заболевания* в населении. Он рассчитывается на основании данных о числе *всех пациентов*, обратившихся за наркологами помощью к врачу психиатру-наркологу или психиатру в течение отчетного года.

Показатели, характеризующие первичную заболеваемость и распространённость, по Калининградской области рассчитаны на 100 тысяч населения на начало года: на 01.01.2022 (с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.) – 1030979, на 01.01.2023 – 1032343, на 01.01.2024 – 1033914, на 01.01.2025 – 1032904.

Показатели по наркомании и алкоголизму по Российской Федерации представлены из сайта Росстата (население, здоровье):

- таблица. Заболеваемость населения наркоманией (данные Минздрава России, расчет Росстата);
- таблица. Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами (данные Минздрава России, расчет Росстата)

Показатели анализировались по основным группам заболеваний, выделяемых в государственной отчетности: психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ – всего, в том числе: расстройства, вызванные пагубным* употреблением алкоголя, расстройства, вызванные пагубным употреблением наркотиков, синдром зависимости от наркотических веществ, расстройства, вызванные пагубным употреблением ненаркотических психоактивных веществ, синдромом зависимости от ненаркотических психоактивных веществ.

Представлен сравнительный анализ показателей первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением алкоголя и наркотических веществ среди всего населения области, среди мужского и женского населения, городских и сельских жителей.

В связи с организацией единой наркологами службы Калининградской области с 2021 года заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ не представляется в разрезе административных территорий Калининградской области (приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 25.11.2019 №820 «Об организации единой наркологами службы Калининградской области»).

Данные информационного бюллетеня рекомендуются для использования при разработке мероприятий, направленных на сохранение здоровья населения.

*Пагубное (с вредными последствиями) употребление - употребление психоактивного вещества (веществ), вызывающее вред для здоровья, при отсутствии признаков синдрома зависимости. Условное обозначение: ↑ - рост, ↓ - снижение. Сокращение: дкл – декалитры

Характеристика общей заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ

В Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Наркологический диспансер Калининградской области» в течение 2025 года находилось под наблюдением 10805 пациентов (что составляет 1,0 % населения области) с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ (далее - ПАВ), что на 1174 пациента меньше, чем в 2024 году (2024г. - 11979, 2023г. - 11856, 2022г. - 11361, 2021г. - 11834), в том числе с синдромом зависимости от алкоголя – 8226 пациентов, что на 369 меньше, чем в 2024 году (2024г. – 8595, 2023г. – 8717, 2022г. – 8020, 2021г. – 8712), из них 2511 женщин, что на 343 случая больше 2024 года (2024г. – 2168, 2023г. – 2273, 2022г. – 2050, 2021г. – 1757).

В 2025 году, в сравнении с 2024 годом, расстройств, вызванных пагубным употреблением (с вредными последствиями):

- алкоголя снизилось до 523 (↓ на 242, 2024г. – 765, 2023г. – 648, 2022г.- 800, 2021г. - 865), из них женщин - 151, что на 2 случая больше 2024 года и 2 раза больше, чем в 2021 году (2024г. – 149, 2023г. – 102, 2022г. – 152, 2021г. – 73);
- наркотиков увеличилось до 698 чел. (↑ на 33, 2024г. – 665, 2023г. – 606, 2022г.- 447, 2021г. - 264),
- ненаркотических ПАВ снизилось до 8 чел. (↓ на 33, 2024г. – 41, 2023г. – 53, 2022г. – 46, 2021г. - 22).

Показатель общей заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ в 2025 году составил 1046,1 на 100 тысяч населения, что на 9,8 % ниже показателя 2024 года (2024г. – 1159,7, 2023г. – 1146,7, 2022г.-1100,5, 2021 г.– 1147,8).

По данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками в 2025 году в Калининградской области объем продаж населению алкогольной продукции (без пива и напитков, изготавливаемых на его основе) снизился в абсолютных цифрах по сравнению с 2024 и 2023 годами, соответственно, на 129,201 тыс. дкл и 95,016 тыс. дкл (2025г. - 1893,564 тыс. дкл, 2024г. - 2022,765 тыс. дкл, в 2023г. - 1988,58 тыс. дкл).

По итогам 2025 года снизилась на 1362,38 и 927,55 тыс. дкл, соответственно, розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в натуральном выражении и составила 3410,977 тыс. дкл (2024г. - 4773,36 тыс. дкл. 2023г. - 4338,527 тыс. дкл).

Розничная продажа алкогольной продукции в 2024 году по Калининградской области составила 7,18 л этанола на душу населения (в литрах этанола), что на 0,38 л превышает среднее значение по Российской Федерации (6,8 л) (2023г. - 6,91 (РФ – 6,56, превышение на 0,35 л), (2022г. – 7,21 (РФ – 6,4, превышение на 0,81 л).

Диспансерное наблюдение за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, в государственных медицинских организациях осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также ¹приказом Минздрава России от 30.12.2015 №1034н, определяющим Порядок диспансерного наблюдения за этой категорией пациентов.

¹Приказ Минздрава России от 30.12.2015 г. № 1034н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ» (п.п.12, 13 приложения №2 к данному приказу), зарегистрирован Минюстом РФ 22.03.2016 № 41495, (в редакции приказа Минздрава России от 2019 г. №573н).

Характеристика первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ – всего (код заболевания по МКБ-10 <1> - F10-F19) в 2025 году составило 765, что на 54 пациента больше, чем в 2024 году (711). Показатель первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ – 74,1 на 100 тыс. населения, что в 1,1 раза выше уровня 2024 года (68,8) (табл.1,рис.1)

Таблица 1. Динамика показателей первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, среди совокупного населения Калининградской области в 2021-2025 годах

Показатели/годы (Классы, нозологии болезней)	2021 год			2022 год			2023 год			2024 год			2025 год			Тенденция сравнение с предыдущим (2024) годом	
	абс.ч.	00/000	%	абс.ч.	00/000	%	абс.ч.	00/000	%	абс.ч.	00/000	%	абс.ч.	00/000	%	графическое выражение	количественное выражение (разы)
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ – всего, в том числе:	773	75,0	100,0	944	91,4	100,0	900	87,0	100,0	711	68,8	100,0	765	74,1	100,0	↑	1,1
Расстройства, вызванные пагубным употреблением алкоголя	208	20,2	26,9	158	15,3	16,7	103	10	11,4	90	8,7	12,7	60	5,8	7,8	↓	1,5
Синдром зависимости от алкоголя	354	34,3	45,8	487	47,2	51,6	521	50,4	57,9	410	39,7	57,7	501	48,5	65,5	↑	1,2
Расстройства, вызванные пагубным употреблением наркотиков	128	12,4	16,6	189	18,3	20,0	148	14,3	16,4	123	11,9	17,3	117	11,3	15,3	↓	1,05
Синдром зависимости от наркотических веществ	71	6,9	9,2	77	7,5	8,2	102	9,9	11,3	81	7,8	11,4	87	8,4	11,4	↑	1,07
Расстройства, вызванные пагубным употреблением ненаркотических психоактивных веществ	12	1,2	1,6	28	2,7	3,0	24	2,3	2,7	6	0,6	0,8	0	0	0,0	↓	до 0
Синдром зависимости от ненаркотических психоактивных веществ	0	0	0,0	5	0,5	0,5	2	0,2	0,2	1	0,1	0,1	0	0	0,0	↓	до 0

<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).




Рис.1. Сравнительная характеристика показателей первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, среди совокупного населения Калининградской области в 2024 – 2025 гг. (на 100 тысяч населения)

В структуре психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, зарегистрированных впервые в жизни среди населения Калининградской области, первое место занимают расстройства, связанные с употреблением алкоголя; совокупный показатель в 2025 году составил – 73,3% (2024г. – 70,4%), на втором месте - доля расстройств, связанных с употреблением наркотических веществ – 26,7% (2024г. – 28,7%); на третьем месте, прочие* - доля расстройств, связанных с употреблением ненаркотических психоактивных веществ (расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств; расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов; расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей) – в 2025 году не зарегистрированы (в 2024г. – 0,9%) (рис.2).




Рис.2. Структура психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, среди совокупного населения Калининградской области в 2024-2025 годах (впервые зарегистрированные, %)

Общая заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением алкоголя

Показатель общей заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя (в т.ч. алкогольные психозы) среди совокупного населения Калининградской области в 2025 году составил 796,4 на 100 тыс. населения (8226 сл.), отмечается снижение на 9,2% (↓ на 837 сл.) в сравнении с 2024 годом (877,4 – 9063 сл.) (рис.4).

За пятилетний период (2021-2025гг.) в возрастной группе 0-14 лет случаи алкоголизма не зарегистрированы, в возрастной группе 15-17 лет в 2025 году зарегистрировано 2 случая (рис.3).

Общая заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя за пятилетний период (2021-2025гг.) выше показателей по Российской Федерации, превышения от 1,2 раз в 2021 году до 1,3 раза в 2024 году (рис.4).




Рис.3. Динамика общей заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя (в т.ч. алкогольные психозы) по возрастным группам в Калининградской области за 2021-2025гг. (абс.ч.)




Рис.4. Динамика общей заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя (в т.ч. алкогольные психозы) среди совокупного населения Калининградской области в сравнении с РФ за 2021-2025гг. (на 100 тыс. населения)

Первичная заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением алкоголя

Показатель первичной заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя (в т.ч. алкогольные психозы) среди совокупного населения Калининградской области в 2025 году составил 48,5 на 100 тыс. населения (501 сл.), отмечается рост на 22,2% (↑ на 91сл.) в сравнении с 2024 годом (39,7– 410 сл.) (рис.6).

За пятилетний период (2021-2025гг.) в возрастной группе 0-14 лет случаи алкоголизма не зарегистрированы, в возрастной группе 15-17 лет в 2025 году зарегистрировано 2 случая) (рис.5).

Первичная заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя за пятилетний период (2021-2025гг.) с 2022 года установилась выше показателей по Российской Федерации, превышения от 1,27 раз в 2022 году до 1,08 раза в 2024 году (рис.4).




Рис.5. Динамика первичной заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя (в т.ч. алкогольные психозы) по возрастным группам в Калининградской области за 2021-2025гг. (абс.ч.)




Рис.6. Динамика первичной заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя (в т.ч. алкогольные психозы) совокупного населения в Калининградской области в сравнении с РФ за 2021-2025гг. (на 100 тыс населения)

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением алкоголя в 2025 году составило 561, из них пагубное употребление алкоголя зарегистрировано у 60 пациентов (2024г. – 90), синдром зависимости от алкоголя у 501 (2024г. – 410), что соответственно, на 30 меньше и 91 больше, чем в 2024 году (табл. 2).

Показатель первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением алкоголя составил - 5,8 на 100 тыс. населения, синдром зависимости от алкоголя - 48,5 на 100 тыс. населения, что соответственно, в 1,5 раза ниже и в 1,2 раза выше, чем в 2024 году (табл. 1).

Таблица 2. Динамика показателей первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением алкоголя, среди возрастных групп населения Калининградской области в 2025 году

Наименование	№ строки	Код по МКБ-10	Зарегистрировано заболеваний впервые в жизни										
			в том числе в возрасте (из графы 4):										
			всего	0-14 лет включительно		15-17 лет включительно		взрослых трудоспособного возраста		из них (из графы 9): взрослых 18-34 года		взрослых старше трудоспособного возраста	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			абс.ч.	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
Расстройства, вызванные употреблением алкоголя, всего	1.1.	F10	561	4	0,7	8	1,4	467	83,2	98	21,0	82	14,6
из них: пагубное употребление алкоголя	1.1.1	F10.1	60	4	6,7	6	10,0	50	83,3	15	30,0	0	0,0
синдром зависимости от алкоголя	1.1.2	F10.2	501	0	0,0	2	0,4	417	83,2	83	19,9	82	16,4

В возрастной структуре впервые выявленных заболеваний психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя, среди всего населения Калининградской области в 2025 году, на долю детей от 0 до 14 лет пришлось 0,7% (4 случая – это пагубное употребление алкоголя), доля подростков 15-17 лет составила - 1,4% (8 случаев, из них 6 случаев – это пагубное употребление алкоголя, 2 случая - синдром зависимости от алкоголя), доля взрослых старше трудоспособного возраста - 14,6% (82 случая - синдром зависимости от алкоголя) и самую значительную долю заняли взрослые трудоспособного возраста - 83,2% (467 случаев, из них 50 случаев – пагубное употребление алкоголя, 417 случаев – синдром зависимости от алкоголя (табл. 2, рис.7).

Обращает внимание, что в возрастной группе взрослые трудоспособного возраста - на долю взрослых 18-34 года приходится – 21,0 % (98 из 467) (табл. 2).



Рис.7. Структура впервые выявленных заболеваний психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, среди возрастных групп населения Калининградской области, в 2025 году, (%)

При сравнении показателей первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, связанными с пагубным употреблением алкоголя отмечается, что среди мужского населения заболеваемость в 2025 году снизилась в 2,4 раза, в абсолютных числах - до 28 (2024 г. – 66), среди женского населения отмечается рост в 1,3 раза, в абсолютных числах - до 32 (2024 г. – 24); синдром зависимости от алкоголя и среди мужского, и среди женского населения увеличился, соответственно, в 1,2 раза и в 1,4 раза, в абсолютных числах среди мужского населения - до 373 (2024 г. – 320), среди женского населения - до 128 (2024 г. – 90).

Первичная заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением алкоголя в 2025 году среди женского населения в 1,03 раза выше, чем среди мужского населения (показатель на 100 тыс. соответствующего населения 5,9 и 5,7 соответственно); синдром зависимости от алкоголя выше 3,3 раза среди мужского населения (показатель на 100 тыс. соответствующего населения 76,5 и 23,5 соответственно) (табл. 3).

Таблица 3. Динамика показателей первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением ПАВ, среди всего населения, мужского и женского населения Калининградской области в 2024-2025 годах

Наименование болезней	ВСЕГО				Тенденция сравнение с предыдущим (2024) годом		ВСЕГО мужчины				Тенденция сравнение с предыдущим (2024) годом		ВСЕГО женщины				Тенденция сравнение с предыдущим (2024) годом	
	2024 год		2025 год		графическое выражение	количественное выражение (разы)	2024 год		2025 год		графическое выражение	количественное выражение (разы)	2024 год		2025 год		графическое выражение	количественное выражение (разы)
	абс.ч.	на 100 тыс.	абс.ч.	на 100 тыс.			абс.ч.	на 100 тыс.	абс.ч.	на 100 тыс.			абс.ч.	на 100 тыс.	абс.ч.	на 100 тыс.		
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, ВСЕГО, в т.ч.:	711	68,8	765	74,1	↑	1,1	562	115,2	551	113,0	↑	1,02	149	27,3	214	39,3	↑	1,4
Расстройства, вызванные пагубным употреблением алкоголя	90	8,7	60	5,8	↓	1,5	66	13,5	28	5,7	↓	2,4	24	4,4	32	5,9	↑	1,3
Синдром зависимости от алкоголя (в т.ч. алкогольные психозы)	410	39,7	501	48,5	↑	1,2	320	65,6	373	76,5	↑	1,2	90	16,5	128	23,5	↑	1,4
Расстройства, вызванные пагубным употреблением наркотиков	123	11,9	117	11,3	↓	1,05	101	20,7	92	18,9	↓	1,1	22	4,0	25	4,6	↑	1,1
Синдром зависимости от наркотических веществ	81	7,8	87	8,4	↑	1,07	68	13,9	58	11,9	↓	1,2	13	2,4	29	5,3	↑	2,2
Расстройства, вызванные пагубным употреблением ненаркотических психоактивных веществ	6	0,6	0	0,0	↓	до 0	6	1,2	0	0,0	↓	до 0	0	0,0	0	0,0	=	0
Синдром зависимости от ненаркотических психоактивных веществ (токсикомания)	1	0,1	0	0,0	↓	до 0	1	0,2	0	0,0	↓	до 0	0	0,0	0	0,0	=	0

При сравнении показателей первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением алкоголя среди городского и сельского населения, отмечается, что заболеваемость в 2025 году и среди городского, и среди сельского населения снизилась, соответственно, в 1,7 раза и 1,2 раза, в абсолютных числах - до 31 (2024 г. – 54) и до 29 (2024г. – 36); синдром зависимости от алкоголя среди городского населения снизился в 1,8 раза (в абсолютных числах - до 170 (2024 г. – 300)), среди сельского населения увеличился в 3,0 раза (в абсолютных числах - до 331 (2024 г. – 110)).

Первичная заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением алкоголя в 2025 году среди сельского населения в 3,1 раза выше, чем среди городского населения (показатель на 100 тыс. соответствующего населения 11,9 и 3,9 соответственно); синдром зависимости от алкоголя - выше в 6,3 раза (показатель на 100 тыс. соответствующего населения 135,8 и 21,5 соответственно) (табл. 4).

Таблица 4. Динамика показателей первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением ПАВ, среди всего населения, городского и сельского населения Калининградской области в 2024-2025 годах

Наименование болезней	ВСЕГО				Тенденция сравнение с предыдущим (2024) годом		ВСЕГО городское население				Тенденция сравнение с предыдущим (2024) годом		ВСЕГО сельское население				Тенденция сравнение с предыдущим (2024) годом	
	2024 год		2025 год		графическое выражение	количественное выражение (разы)	2024 год		2025 год		графическое выражение	количественное выражение (разы)	2024 год		2025 год		графическое выражение	количественное выражение (разы)
	абс.ч.	на 100 тыс.	абс.ч.	на 100 тыс.			абс.ч.	на 100 тыс.	абс.ч.	на 100 тыс.			абс.ч.	на 100 тыс.	абс.ч.	на 100 тыс.		
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, ВСЕГО, в т.ч.:	711	68,8	765	74,1	↑	1,1	514	65,1	272	34,5	↓	1,9	197	80,9	493	202,3	↑	2,5
Расстройства, вызванные пагубным употреблением алкоголя	90	8,7	60	5,8	↓	1,5	54	6,8	31	3,9	↓	1,7	36	14,8	29	11,9	↓	1,2
Синдром зависимости от алкоголя (в т.ч. алкогольные психозы)	410	39,7	501	48,5	↑	1,2	300	38,0	170	21,5	↓	1,8	110	45,1	331	135,8	↑	3,0
Расстройства, вызванные пагубным употреблением наркотиков	123	11,9	117	11,3	↓	1,05	91	11,5	21	2,7	↓	4,3	32	13,1	96	39,4	↑	3,0
Синдром зависимости от наркотических веществ	81	7,8	87	8,4	↑	1,07	65	8,2	50	6,3	↓	1,3	16	6,6	37	15,2	↑	2,3
Расстройства, вызванные пагубным употреблением ненаркотических психоактивных веществ	6	0,6	0	0,0	↓	до 0	3	0,4	0	0,0	↓	до 0	3	1,2	0	0,0	↓	до 0
Синдром зависимости от ненаркотических психоактивных веществ	1	0,1	0	0,0	↓	до 0	1	0,1	0	0,0	↓	до 0	0	0,0	0	0,0	↓	до 0

Общая заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением наркотических веществ

Показатель общей заболеваемости наркоманией среди совокупного населения Калининградской области в 2025 году составил 131,5 на 100 тыс. населения (1358 сл.), отмечается незначительный рост на 7,7% (↑ на 16 чел.) в сравнении с 2024 годом (129,9 - 1342 сл.) (рис. 9).

За пятилетний период (2021-2025гг.) в возрастной группе 0-14 лет случаи наркомании не зарегистрированы, в возрастной группе 15-17 лет в 2021 году зарегистрировано 2 случая, 2022г. – 3, 2023г. – 6, 2024г.- 5, 2025г. – 8 (рис. 8).

Общая заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ за пятилетний период (2021-2025гг.) установилась выше показателей по Российской Федерации, превышения от 1,11 раз в 2021 году до 1,09 раза в 2024 году (рис.9).




Рис.8. Динамика общей заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ по возрастным группам в Калининградской области за 2021-2025гг. (абс.ч.)




Рис.9. Динамика общей заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ среди совокупного населения Калининградской области в сравнении с РФ за 2021-2025гг. (на 100 тыс. населения)

Первичная заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением наркотических веществ

Показатель первичной заболеваемости наркоманией среди совокупного населения Калининградской области в 2025 году составил 8,4 на 100 тыс. населения (87 сл.), отмечается рост на 7,7 % (↑ на 6 чел.) в сравнении с 2024 годом (7,8 - 81 сл.) (рис. 11).

За пятилетний период (2021-2025гг.) в возрастной группе 0-14 лет случаи наркомании не зарегистрированы, в возрастной группе 15-17 лет в 2021 году зарегистрирован 1 случай, 2022г. – 1, 2023г. – 2, 2024г.- 1, 2025г. – 8 (рис. 10).

Первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ за пятилетний период (2021-2025гг.) установилась ниже показателей по Российской Федерации, снижение от 1,26 раз в 2021 году до 1,12 раза в 2024 году, за исключением 2023 года, где показатель по области превысил показатель по РФ в 1,18 раз (рис.9).




Рис.10. Динамика первичной заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ по возрастным группам в Калининградской области за 2021-2025гг. (абс.ч.)




Рис. 11. Динамика первичной заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ среди совокупного населения Калининградской области в сравнении с РФ за 2021-2025гг. (на 100 тыс. населения)

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением наркотических веществ в 2025 году составило 204, из них пагубное употребление наркотических веществ зарегистрировано у 117 пациентов (2024г. – 123), синдром зависимости от наркотических веществ у 87 (2024г. – 81), что соответственно, на 6 меньше и 6 случаев больше, чем в 2024 году (табл. 3).

Показатель первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением наркотических веществ в 2025 году составил 11,3 на 100 тыс. населения, синдром зависимости от наркотических веществ – 8,4 на 100 тыс. населения, что соответственно, в 1,05 раза ниже и в 1,07 раза выше, чем в 2024 году (табл. 1).

Таблица 5. Динамика показателей первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением наркотических веществ, среди возрастных групп населения Калининградской области в 2025 году

Наименование	№ строки	Код по МКБ-10	Зарегистрировано заболеваний впервые в жизни										
			в том числе в возрасте (из графы 4):										
			всего	0-14 лет включительно		15-17 лет включительно		взрослых трудоспособного возраста		из них (из графы 9): взрослых 18-34 года		взрослых старше трудоспособного возраста	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			абс.ч.	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
Расстройства, вызванные употреблением наркотических веществ, всего	1.1.		204	1	0,5	27	13,2	176	86,3	82	46,6	0	0,0
из них: пагубное употребление наркотических веществ	1.1.1	F11.1; F12.1; F13.1; F14.1; F15.1; F16.1; F18.1; F19.1	117	1	0,9	19	16,2	97	82,9	57	58,8	0	0,0
синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)	1.1.2	F11.2; F12.2; F13.2; F14.2; F15.2; F16.2; F18.2; F19.2	87	0	0,0	8	9,2	79	90,8	25	31,6	0	0,0

В возрастной структуре впервые выявленных заболеваний психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотических веществ, среди всего населения Калининградской области в 2025 году, на долю детей от 0 до 14 лет пришлось 0,5% (1 случай - это пагубное употребление наркотических веществ), доля подростков 15-17 лет составила – 13,2% (27 случаев, из них – 19 случаев – это пагубное употребление наркотических веществ, 8 случаев – синдром зависимости от наркотических веществ), значительную долю заняли взрослые трудоспособного возраста - 86,3% (176 случаев, из которых 97 случаев это пагубное употребление наркотических веществ, 79 случаев – синдром зависимости от наркотических веществ), среди взрослых старше трудоспособного возраста случаи не зарегистрированы (табл.5, рис.12).

Обращает внимание, что в возрастной группе взрослые трудоспособного возраста - на долю взрослых 18-34 года приходится – 46,6 % (82 из 176) (табл. 5).




Рис.12. Структура впервые выявленных заболеваний психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотических веществ, среди возрастных групп населения Калининградской области, в 2025 году, (%)

В 2025 году, в сравнении с 2024 годом, в структуре первичной заболеваемости наркоманией распределение пациентов по виду употребляемого наркотика следующее: отмечается увеличение доли заболеваемости вследствие употребления каннабиноидов до 56,3% (2024г. – 4,9), других психостимуляторов до 32,2% (2024г. – 12,4 %) и уменьшение доли больных опиоидной наркоманией до 11,5% (2023г. – 18,5%), других наркотиков и их сочетаний до 0 (2024г. – 64,2%) от общего числа впервые обратившихся за лечением больных наркоманией (рис.13).




Рис.13. Структура распределения пациентов, зарегистрированных впервые в жизни, с расстройствами, вызванными употреблением опиоидов, каннабиноидов, кокаина, других психостимуляторов, других наркотиков и их сочетаний, в пересчете на общее число зависимых от наркотических веществ в 2021-2025гг., (%)

При сравнении показателей первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, связанными с пагубным употреблением наркотиков среди мужского и женского населения, отмечается, что первичная заболеваемость в 2025 году среди мужского населения снизилась 1,1 раза, в абсолютных числах - до 92 (2024 г. – 101), среди женского населения отмечается рост в 1,1 раза, в абсолютных числах - до 25 (2024 г. – 22); синдром зависимости от наркотических веществ среди мужского населения снизился в 1,2 раза, в абсолютных числах - до 58 (2024 г. – 68), среди женского населения отмечается рост в 2,2 раза, в абсолютных числах - до 29 (2024 г. – 13).

Первичная заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением наркотических веществ в 2025 году среди мужского населения в 4,1 раза выше, чем среди женского населения (показатель на 100 тыс.

соответствующего населения 18,9 и 4,6 соответственно); синдром зависимости от наркотических веществ среди мужского населения выше 2,2 раза (показатель на 100 тыс. соответствующего населения 11,9 и 5,3 соответственно) (табл. 3, рис.14).

Первичная заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением наркотических веществ и синдром зависимости от наркотических веществ в 2025 году выше среди мужского населения, чем среди женского населения, соответственно, в 4,1 раза 2,2 раза (18,9 и 4,6 на 100 тыс. соответствующего населения) и (11,9 и 5,3 на 100 тыс. соответствующего населения) (табл. 3, рис.14).




Рис.14. Сравнительная характеристика первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ среди мужского и женского населения Калининградской области в 2025 году (на 100 тысяч соответствующего населения)

При сравнении показателей первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением наркотиков отмечается, что первичная заболеваемость в 2025 году среди городского населения снизилась в 4,3

раза, в абсолютных числах - до 21 (2024 г. – 91), среди сельского населения отмечается рост в 3,0 раза, в абсолютных числах - до 96 (2024 г. – 32); синдром зависимости от наркотических веществ среди городского населения снизился в 1,3 раза, в абсолютных числах - до 50 (2024 г. – 65), среди сельского населения отмечается рост в 2,3 раза, в абсолютных числах - до 37 (2024 г. – 16).

Первичная заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением наркотических веществ и синдром зависимости от наркотических веществ в 2025 году выше среди сельского населения, чем среди городского населения, соответственно, в 14,6 раза и 2,4 раза (39,4 и 2,7 на 100 тыс. соответствующего населения соответственно) и (15,2 и 6,3 на 100 тыс. соответствующего населения соответственно) (табл. 4, рис. 15).




Рис.15. Сравнительная характеристика первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ среди городского и сельского населения Калининградской области в 2025 году (на 100 тысяч соответствующего населения)

ВЫВОДЫ:

по данным статистической формы 11 «Сведения о заболеваниях наркологических расстройствами» (таблица 1000: Сведения о числе заболеваний наркологических расстройствами, зарегистрированных впервые в жизни у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации, единица) в Калининградской области в 2025 году установлено:

- В структуре психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, в 2025 году на долю расстройств, связанных с употреблением алкоголя приходится 73,3%, на долю расстройств, связанных с употреблением наркотических веществ – 26,7%.
- Показатель первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением алкоголя составил 5,8 на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза ниже показателя 2024 года (8,7), синдром зависимости от алкоголя - 48,5 на 100 тыс. населения, что в 1,2 раза выше, чем в 2024 году (39,7).
- В возрастной структуре впервые выявленных заболеваний психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, доля взрослого населения трудоспособного возраста составила 83,2%, из них доля взрослых 18-34 года – 21,0 %; на долю детей от 0 до 14 лет пришлось 0,7%, доля подростков 15-17 лет составила – 1,4%.
- Среди женского населения отмечается рост первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, связанными с пагубным употреблением алкоголя в 1,3 раза, в абсолютных числах - до 32 (2024 г. – 24) и синдром зависимости от алкоголя в 1,3 раза, в абсолютных числах до 128 (2024 г. – 90).
- Среди мужского населения отмечается снижение первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, связанными с пагубным употреблением алкоголя в 2,4 раза, в абсолютных числах - до 28 (2024 г. – 66); рост - синдром зависимости от алкоголя в 1,2 раза, в абсолютных числах до 373 (2024 г. – 320).
- В 2025 году первичная заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, вызванными пагубным употреблением алкоголя среди женского населения на 3,5% выше, чем среди мужского населения (показатель на 100 тыс. соответствующего населения 5,9 и 5,7 соответственно); соотношение всего женщины/мужчины - 1,03:1(2024г. – 1:3,0);
- Синдром зависимости от алкоголя среди мужского населения выше в 3,3 раза, чем среди женского населения (показатель на 100 тыс. соответствующего населения 76,5 и 23,5 соответственно); соотношение всего женщины/мужчины -1:3,3 (2024г. - 1:3,9)
- Среди городского и сельского населения первичная заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением алкоголя снизилась, соответственно, в 1,7 раза и 1,2 раза, в абсолютных числах - до 31 (2024 г. – 54) и до 29 (2024г. – 36);
- Первичная заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением алкоголя среди сельского населения в 3,1 раза выше, чем среди городского населения (показатель на 100 тыс. соответствующего населения 11,9 и 3,9 соответственно); соотношение всего город/село – 1:3,1 (2024г. – 1:2,2).
- Среди городского населения синдром зависимости от алкоголя снизился в 1,8 раза (в абсолютных числах - до 170 (2024 г. – 300)), среди сельского населения - увеличился в 3,0 раза (в абсолютных числах - до 331 (2024 г. – 110)).
- Синдром зависимости от алкоголя среди сельских жителей в 6,3 раза выше, чем среди городских (показатель на 100 тыс. соответствующего населения 135,8 и 21,5 соответственно); соотношение всего город/село – 1:6,3 (2024г. – 1:1,2).
- Первичная заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя за пятилетний период (2021-2025гг.) с 2022 года установилась выше показателей по Российской Федерации, превышения от 1,27 раз в 2022 году до 1,08 раза в 2024 году.
- Розничная продажа алкогольной продукции в 2024 году по Калининградской области) составила 7,18 л этанола на душу населения (в литрах этанола), что на 0,38 л превышает среднее значение по Российской Федерации (6,8 л этанола на душу населения (2023г. - 6,91 (РФ – 6,56), превышение на 0,35 л), (2022г. – 7,21 (РФ – 6,4), превышение на 0,81 л).

- Показатель первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением наркотических веществ составил 11,3 на 100 тыс. населения, что в 1,05 раза ниже показателя 2024 года (11,9), синдрома зависимости от наркотических веществ - 8,4 на 100 тыс. населения, что в 1,07 раза выше, чем в 2024 году (7,8).
- В возрастной структуре впервые выявленных заболеваний психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотических веществ - доля взрослого населения трудоспособного возраста составила 86,3%, из них доля взрослых 18-34 года – 46,6 %; на долю детей от 0 до 14 лет пришлось 0,5%, доля подростков 15-17 лет составила – 13,2%.
- Первое место по потреблению наркотических веществ в 2025 году, в сравнении с 2024 годом, заняли каннабиноиды (препараты конопли) - 56,3% (2024г. – 4,9), на долю других психостимуляторов пришлось - 32,2% (2024г. – 12,4 %), уменьшилась доля расстройств, вызванных употреблением опиоидов - до 11,5% (2023г. – 18,5%), других наркотиков и их сочетаний до 0 (2024г. – 64,2%) от общего числа впервые обратившихся за лечением больных наркоманией.
- Отмечается рост наркопотребителей среди женщин. В 2025 году рост первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, связанными с пагубным употреблением наркотических веществ, в сравнении с 2024 годом, составил 1,1 раза, в абсолютных числах - до 25 (2024г. – 22); синдром зависимости от наркотических веществ увеличился в 2,2 раза, в абсолютных числах - до 29 (2024 г. – 13).
- Среди мужского населения отмечается снижение первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, связанными с пагубным употреблением наркотических веществ в 1,1 раза, в абсолютных числах - до 92 (2024 г. – 101) и синдром зависимости от наркотических веществ в 1,2 раза, в абсолютных числах до 58 (2024 г. – 68).
- В 2025 году первичная заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, связанными с пагубным употреблением наркотических веществ среди мужского населения в 4,1 раза выше, чем среди женского населения (показатель на 100 тыс. соответствующего населения 18,9 и 4,6 соответственно); соотношение всего мужчины/женщины - 1:4,1(2024г. – 1:5,2);
- Синдром зависимости от наркотических веществ среди мужского населения выше, чем среди женского населения в 2,2 раза (показатель на 100 тыс. соответствующего населения 11,9 и 5,3 соответственно); соотношение всего женщины/мужчины -1:2,2 (2024г. - 1:5,8)
- Среди городского и сельского населения, отмечается, что первичная заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением наркотиков среди городского населения снизилась в 4,3 раза, в абсолютных числах - до 21 (2024 г. – 91), среди сельского населения отмечается рост в 3,0 раза, в абсолютных числах - до 96 (2024 г. – 32); синдром зависимости от наркотических веществ среди городского населения снизился в 1,3 раза, в абсолютных числах - до 50 (2024 г. – 65), среди сельского населения отмечается рост в 2,3 раза, в абсолютных числах - до 37 (2024 г. – 16).
- Первичная заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными пагубным употреблением наркотических веществ среди сельского населения в 14,6 раза выше, чем среди городского населения (показатель на 100 тыс. соответствующего населения 39,4 и 2,7 соответственно); синдром зависимости от наркотических веществ среди сельского населения выше в 2,4 раза (показатель на 100 тыс. соответствующего населения 15,2 и 6,3 соответственно).
- Первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ за пятилетний период (2021-2025гг.) установилась ниже показателей по Российской Федерации, снижение от 1,26 раз в 2021 году до 1,12 раза в 2024 году, за исключением 2023 года, где показатель по области превысил показатель по РФ в 1,18 раз.